

SLT	NÁZEV SOUBORU LESNÍCH TYPŮ (forest types group)	BONITA	CHARAKTER STANOVIŠTĚ (characteristic of site) + VÝSKYT V PŘÍRODNÍ LESNÍ OBLASTI + ROZLOHA V ČR 2001	PŘIROZENÁ DŘEVINNÁ SKLADBA (PDS) (natural species composition)
		EP PP IH cena		CHARAKTERISTICKÉ DRUHY FYTOCENÓZ
0M	CHUDÝ BOR (<i>Querceto</i>)- <i>Pinetum</i> <i>oligotrophicum</i>	BO 20 DB 18	<ul style="list-style-type: none"> v obvodech minerálně chudých písčitých půd, podzol arenický, středně výrazný, regozem arenická, písčitá - štěrkovitá, propustná, vysychavá, silně kyselá PLO: 2-6,9-12,15-21,23,31 16 013 ha – 0,60% 	BO 8-10 DBZ ±1 BŘ ±1 BK 0± SM 0± <ul style="list-style-type: none"> <i>Vaccinium myrtillus</i>, <i>Vaccinium vitis-idaea</i>, <i>Calluna vulgaris</i>, <i>Cladonia</i> sp., <i>Cetraria</i> sp., <i>Leucobryum glaucum</i>, <i>Dicranum undulatum</i>, <i>Dicranum scoparium</i>
		EP 1 PP 1 IH - D 1,57		
Chudý bor (s dubem) je půdně podmíněným společenstvem převážně 2. – 4. lvs. Jeho původnost v podmínkách mírného pásu Evropy lze vysvětlit jako dodatečné šíření BO z drobných postglaciálních relikvů v extrémních polohách (OZ, OY) na přilehlá plošně významnější chudá stanoviště, kde chyběla konkurence náročnějších listnáčů. V extrémních podmínkách zvýšit podíl BŘ; využít SM v podrostu.				
Lesní typy:			Podsoubory lesních typů (PLT) LČR	
do r. 2015			od r. 2016	
			<i>(řazeno abecedně nezávisle na čísle LT vlevo)</i>	
0	– podle oblastí		antropogenní	OM- modální
1	vřesový		modální	OMbk bukový
2	– podle oblastí		chudší	OMe svahový
3	borůvkový (s brusinkou)			OMk antropogenní
4				OMq na dunách
5	lišejníkový			OMz zakrslejší
6	na dunách			
7	– podle oblastí			
8				
9	svahový (brusinkový)		specifický na dunách	

