

SLT	NÁZEV SOUBORU LESNÍCH TYPŮ (forest types group)	BONITA	CHARAKTER STANOVIŠTĚ (characteristic of site) + VÝSKYT V PŘÍRODNÍ LESNÍ OBLASTI + ROZLOHA V ČR 2001	PŘIROZENÁ DŘEVINNÁ SKLADBA (PDS) (natural species composition)	
		EP		CHARAKTERISTICKÉ DRUHY FYTOCENÓZ	
		PP			
		IH			
		cena			
9K	KLEČOVÁ SMRČINA <i>Mugheto-Piceetum acidophilum</i>	SM 1-10	<ul style="list-style-type: none"> na přechodu mezi stupněm smrkovým a klečovým, na horní hranici lesa, Krkonoše, hřbety, svahy a plošiny s podložím krystalinika, ranker podzolový, podzol modální horský drnový až rankerový, hlinitopísčité s podílem štěrku a kamene, mocná vrstva mörü PLO: 22,27 • 802 ha – 0,03% 	SM 5-8 KOS 2-5 JŘ ±1 <ul style="list-style-type: none"> <i>Nardus stricta, Calamagrostis villosa, Vaccinium myrtillus, Vaccinium vitis-idaea, Avenella flexuosa, Sphagnum sp., Homogyne alpina, Trientalis europaea</i> 	
		EP 6			
		PP 1			
		IH - E			
		1,67			
Společenstvo klečové smrčiny je vyšším stupněm subalpinských smrčín v drsných klimatických podmínkách, charakteristické různě vzdálenými skupinami a hloučky zcela zavětvených SM, mezi něž sestupuje kosodřevina a stálou příměs tvoří zakrslý JŘ. S nadmořskou výškou přechází i SM do zakrslých forem s deformovanými korunami. Cílové složení porostů odpovídá přirozené skladbě.					
Lesní typy:			Podsoubory lesních typů (PLT) LČR		
	do r. 2015	od r. 2016	(řazeno abecedně nezávisle na čísle LT vlevo)		
0	na hřbetech a svazích bezklečová (PLO 27)		9K-	modální	
1	skeletová	modální (PLO22)	9Ki	iniciální bezklečová	
2	borůvková se třtinou	modální jesenická bezklečová			
3		skeletnatá (PLO 22)			
4					
5					
6					
7					
8					
9					

