

SLT	NÁZEV SOUBORU LESNÍCH TYPŮ (forest types group)	BONITA	CHARAKTER STANOVIŠTĚ (characteristic of site) + VÝSKYT V PŘÍRODNÍ LESNÍ OBLASTI + ROZLOHA V ČR 2019	PŘIROZENÁ DŘEVINNÁ SKLADBA (PDS) (natural species composition)		
		EP		CHARAKTERISTICKÉ DRUHY FYTOCENÓZ		
		PP		POTENCIÁLNÍ PŘÍRODNÍ BIOTOP (KATALOG BIOTOPŮ ČR 2010)		
		IH		SKUPINY TYPŮ GEOBIOCÉNŮ (BUČEK, LACINA 1999; ZLATNÍK 1971)		
		cena		FYTOCENOLOGICKÁ JEDNOTKA (VEGETACE ČR M. CHYTRÝ 2013)		
<b>4B</b>	<b>BOHATÁ BUČINA</b> <i>Fagetum mesotrophicum</i>	SM 28-30 BO 26 DB 26 BK 28 EP 2 PP 5,5 IH - A 7,56	<ul style="list-style-type: none"> <li>z pahorkatin do vrchovin, v nížinách úžlabiny a báze svahů, ve vyšších polohách slunné svahy, bohatý substrát, <b>kambizem modální mezotrofní-eutrofní, vyluhovaná karbonátová, místy pararendzina modální i kambická</b>, vlhká, propustná, mírně štěrkovitá</li> <li>PLO: 2-7,10-12,15,16,18-21,23,24,26-31,33,36-41</li> <li>79 332,30 ha – 2,89 %</li> </ul>	<b>BK 8-10 JD 0-1 LP ±2 HB ±2 DB 0± JV ±1 JL +</b> <ul style="list-style-type: none"> <li><i>Galium odoratum, Brachypodium sylvaticum, Melica uniflora, Festuca altissima, Carex sylvatica, Dentaria bulbifera, Dentaria enneaphyllos, Sanicula europaea, Bromus benekenii, Actaea spicata, Hepatica nobilis</i></li> </ul> L5.1 - Květnaté bučiny 4BD3/4B3/4B-BC3 - Fageta tiliae/Fageta typica/Fageta aceris LBC01/LBC03 - <i>Galio odorati-Fagetum sylvaticae/Carici pilosae-Fagetum sylvaticae</i>		
Klimaxové BK zaujímají souvislejší plochy především v karpatské oblasti. Dominantní BK je ve svém optimu produkce i rozšíření většinou i velmi kvalitní a v jednoduché výstavbě, víceméně bez cenných listnáčů, tvoří příměs jen JD, sporadicky DBZ. Chudé je i keřové patro (bezy rychle obsazují světliny). V cílové skladbě zaujímá BK rozhodující roli v trvalosti ekosystému, v úrovni spolu s JD se podílí na produkci i stabilitě porostu a nevylučuje se jako monokultura.						
			Lesní typy:		Podsoubory lesních typů (PLT) LČR	
			od r. 2019	do r. 2018		
<b>0</b>	antropogenní				3Bk	antropogenní
<b>1</b>	modální		mařinková		3B-	modální
<b>2</b>	chudší		s ostřicí chlupatou			
<b>3</b>	nitrofilnější		válečková			
<b>4</b>	sušší		javorová			
<b>5</b>	-		s kostřavou nejvyšší; (se strdivkou jednokvětou)			
<b>6</b>	-		– podle oblastí			
<b>7</b>	skeletnatější		(čedičová)		3Ba	kamenitá acerozní
<b>8</b>	-					
<b>9</b>	-		svahová		3Be	svahová

